

日期: 100年7月19日

內容摘要:

- (填寫說明: 1. 如有附件請註明, 如簡報檔、全文檔等
- 2. 需有問題與討論: 請註明姓名並包含醫學倫理及 EBM 之應用
- 3. 需有總結, 請註明做結論者【主持人】姓名
- 4. 請自行編排頁碼)

時間: 100.7.19
 名稱: Journal meeting
 討論者: CR 趙韶倫, F. 許昭文
 紀錄: R2 許哲毅

<Topic> Journal meeting

<Q&A>

- ① CR 趙韶倫: STEMI 的病人治療有什麼?
 R2 許哲毅: MONA: Morphine, O₂, NTG, Aspirin; PCI or fibrinolytic.
- ② F 許昭文: 那 Morphine 和 O₂ 要 routine 給嗎?
 R2 吳志華: Morphine 在 STEMI 較建議. 在 NON-STEMI 可能 ↑ mortality
 O₂ 若 SpO₂ < 94% 再給即可.
- ③ CR 趙韶倫: NTG 有何 contraindication?
 R2 周光緯: RF ventricle infarction 時不能用, 可能會 shock
- ④ F 許昭文: Heparin 在 STEMI 的 dose 是?
 R2 吳志華: loading dose 60 mg/kg (max 4000u), then 12.5 mg/hr.
- ⑤ CR 趙韶倫: door-to-balloon, door-to-needle time?
 PG 許昭文: 90 min, 30 min.
- ⑥ CR 趙韶倫: pulmonary edema 成因?
 R2 吳志華: pulmonary vessel 的水滲入 alveoli 內.
- ⑦ CR 趙韶倫: 有哪些症狀?
 R2 周光緯: SOB, cough, pink sputum, PE: rales crackle

內容摘要 (續):

⑧ F評課文: 潛水夫病成因?

R評課文: 上升時 gas 溶解度↑, 但上升太快時, 溶解度
太快, gas bubble 形成↑ 所造成。

⑨ F評課文: Oxygen toxicity 症狀!

R評課文: Com's chge. vertigo. nausea. Tremors ... 等

⑩ CR 題幼倫: 除了 air bubble 形成之外, diving 的受傷還有:

R評課文: Barotrauma. due to 水壓↑.
ear drum rupture. Tinnitus ... 等等。

<EDM & EHR>

1. pre-hospital ECG may ↓ start PCI time
2. about 1.4% 三級病人有 pulmonary edema 症狀, risk factor 有
HTN, long course, female fish oil use.
3. limited diving time & depth, & time to surface

<Key point>

1. myocardial infarction 的分類和治療有不同, 要清楚知道。
2. 到院前 ECG 可能有益, 現已開始。
3. diving associated disease.

<VS comment> F評課文

1. 本院已開始 pre-hospital ECG, 請大家留意
2. 潛水活動漸 popular, 請大家注意再注意 associated symptom.

吳火獅