

日期

100年 10月 18日

內容摘要：

- (填寫說明：1. 如有附件請註明，如簡報檔、全文檔等
2. 需有問題與討論：請註明姓名並包含醫學倫理及 EBM 之應用
3. 需有總結，請註明做結論者【主持人】姓名
4. 請自行編排頁碼)

會議名稱：毒物藥物中毒 lecture

時間：2011/10/18 08:30

主持人：VS 林立偉

記錄：R2 游姿寧

< Topic > TCA intoxication

< Q & A >

CR 林俊龍 Q: TCA 常用於治療何種疾病?

R2 許力云 A: depression.

CR 林俊龍 Q: TCA 的作用機轉為何?

R2 周光禮 A: 抑制 presynaptic reuptake of NE and serotonin.

CR 林俊龍 Q: 為何 TCA 會致死?

R2 吳志華 A: 具有抑制 M-AChR, peripheral α_1 -R, Na channel 及 GABA 等作用.

VS 林立偉 Q: TCA 之成人致死 dose 為何?

R1 張正霆 A: 大於 1g.

VS 林立偉 Q: 臨床上會看到哪些特徵?

R1 王帝皓 A: conduction, contractility, confusion, convulsion 等 f.c.

CR 林俊龍 Q: EKG 上的變化?

R3 林逸婷 A: RBBB, \uparrow PR, \uparrow QRS, \uparrow QTc.

CR 林俊龍 Q: 最常見的 EKG 變化?

R2 吳志華 A: sinus tachycardia!

CR 林俊龍 Q: TCA intoxication 者 CPR 不易成功的原因?

R1 羅志威 A: refractory hypotension 造成.

CR 林俊龍 Q: EKG 上可看哪個 lead 的變化?

R3 林逸婷 A: aVR.

內容摘要 (續):

VS 林立偉 Q: management 中何者最重要?

R1 張正靈 A: early intubation!

<EBM & Evidence>

VS 林立偉 Q: TCA 中毒, 催吐有效嗎? 家属一直要求洗胃, 可以嗎?

R2 許力文 A: 絕對不可催吐, 但可放 OG tube, 以大管徑洗胃。
在服藥後 12 小時內均可洗, 之後可以用 1g/kg 之 dose 的活性炭加強吸附。注意病人之後可能會 ileus。

<key points>

1. TCA 中毒很危險, 小朋友吃 2[#] 約 500mg 的藥就可能死亡!
2. 重點以 EKG 及臨床判斷為準。
3. 若在 12 小時內, 建議先插管, 之後放 OG tube 吃。
4. 某些 Antiarrhythmia drug 可使用。

<VS comments>

VS. 林立偉: 培養靈敏的感覺, 對毒性強的毒藥扣要熟悉, 能及早插管的就不要遲疑。

記錄: R2 游學寧