

日期

100年11月8日

內容摘要：

- (填寫說明：1. 如有附件請註明，如簡報檔、全文檔等  
2. 需有問題與討論：請註明姓名並包含醫學倫理及 EBM 之應用  
3. 需有總結，請註明做結論者【主持人】姓名  
4. 請自行編排頁碼)

會議 = Spectacular lecture

時間 = 2011/11/08

主持人 = VS 張志華

紀錄 = R 張志華

Topic > Psychiatric Emergencies and ER violence.

< Q & A >

Q1 VS 張志華：遇到攻擊性的 P4 要注意什麼？

A1 P4 施毅文：P4 有無 weapons, 逃離路線。

Q2 VS 張志華：遇到躁動 P4 如何處理？

A2 R 羅素威：physical restraint, chemical restraint.

Q3 VS 張志華：一般人的安全距離

A3 R 璋皓：hand shaking distance comfort zone.

Q4 VS 張志華：若是躁動的病人，comfort zone?

A4 R 張謙：2-3 倍的一般 distance.

Q5 VS 張志華：要如何注意可能的病人

A5 P4 黃曉暉：可由 P4 的表現, history 來注意, 物質 abuse.

Q6 VS 張志華：Substance dependence, or abuse carries 的 violence?

A6 P4 璋皓：30 倍的機會

內容摘要 (續):

Q7 張志華: 如果伴有反社會人格加上 Substan abuse, APPR 類是 100 倍的 RISK,

Q8 張志華: 那些表現可能暗示 Violence,

A8 張志華: 如 Angry words, Coarse language, Physical agitation

Q9 張志華: 當遇到處理不來的情況:

A9 張志華: 找人幫忙, 真的不行就只能用 Physical restraints.

Q10 張志華: Physical restraint 要幾個人?

A10 張志華: 至少 5 個人 (以上)

< EBM & Ethics >

1. 遇到 violence 的情況, 保護自己是最重要的;

2. Physical restraints 至少 5 個人

3. Restrain 病人後要檢查 Patient 身上是否有危險物品。

< Key points >

1. 身穩行事,

2. 相互支援

3. 人多好辦事。

< Vs comment > 張志華

1. Physical restraint 至少 5 個人

2. Chemical restraint 通常是用 2M. } Dormicum  
Lorazepam

3. 喝酒病人用 B20 要小心, 怕呼吸抑制; 若長期喝酒或服用 B20 則打 B20 可能會躁動

(! Dose 不夠)