

日期

09 年 2 月 24 日

內容摘要：

- 1. 如有附件請註明，如簡報檔、全文檔等
- 2. 需有問題與討論：請註明姓名並包含醫學倫理及 EBM 之應用
- 3. 需有總結，請註明做結論者【主持人】姓名
- 4. 請自行編排頁碼)

時間: 2010/02/24

會議名稱: OHCA/ILCA morbidity & mortality

主持: 曾麗珠 / VS 陳國強

記錄: R1 林逸峰

(Q&A)

CR 許瑞文 Q: 何謂 OHCA?

PGY 徐盛邦 A: In hospital cardiac arrest.

CR 許瑞文 Q: OHCA PE 急救時 edo 是在看什麼?

PGY 林上超 A: Intend bleed, pericardial effusion
Iv or portal air, coronal thrombus.

CR 許瑞文 Q: DDAVP 在 bleed 病人的機制?

吳博怡 A: 主要可 releasing factor VII from storage sites

CR 許瑞文 Q: DDAVP 的劑量及使用技巧?

吳博怡 A: dose 0.3 µg/kg. 4 分鐘 (4mcg/amp) in N/S 100ml in 30min

CR 許瑞文 Q: 如何去 approach 一有 consciousness change 的病人?

沈謝昭揚 A: 叫叫 ABC.

CR 許瑞文 Q: 如何確認 endo 位置正確?

沈謝昭揚 A: 看若 endo 通過 tracheal cord, 吸氣時五分鐘.

CR 許瑞文 Q: 配有何儀器可幫助?

R1 蔡永峰 A: end-tidal CO2.

CR 許瑞文 Q: end-tidal CO2 在哪些 PE 不適用?

R1 林逸峰 A: cardiac-pulmonary arrest.

CR 許瑞文 Q: 這類的病人使用何種裝置較準確?

R1 李健榮 A: esophageal detection devices.

內容摘要 (續):

<EBM & Ethics> Paper: Emergent endoscopy for UGI bleed patients

R2 管理銘: 什麼情況下會於 GI man 做緊急 endoscopy?

Uremic bleedg: von Willebrand factor decreased function

R2 管理銘: How to treat uremic bleedg?

hemodialysis, EPO, cryoprecipitate, DDAVP

(成份主要是 Factor VIII, vWF, fibrinogen)

R2 管理銘: Emergent endoscopy for UGI bleedg patients?

risk group U disease, CrI. >65 y/o.

OG for migration

<Key Point> 1. uremic bleedg 是 risk factor 之一。
需 emergent endoscopy -

2. DDAVP 0.3 µg/kg & cryoprecipitate.

<VS comments> 3. 一定要 check endo 位置並記錄 end tidal CO₂

OR 許謙文: GI bleedg 在 ER 是很常見的主訴。

要知道如何評估危險程度及適當治療方法。

VS 陳國智: 臨床的 basic knowledge 也很重要。

high dose PPI 也將會使用, 已納入 guideline.

記錄: R1 林逸婷