

日期

2010年8月2日

內容摘要:

- (填寫說明: 1. 如有附件請註明, 如簡報檔、全文檔等
- 2. 需有問題與討論: 請註明姓名並包含醫學倫理及 EBM 之應用
- 3. 需有總結, 請註明做結論者【主持人】姓名
- 4. 請自行編排頁碼)

時間 = 2010/08/02

地點 = B2 同心園

主持人 = 區連立明主任

紀錄 = R2 朱建勳

<Topic> tPA Indicator & Case discussion.

<QQA> 區連立明 Q: 品質指標 of Acute Ischemic Stroke

R2 朱建勳 A: 1. 禁作 2 hour 到院
2. Dr to CT time < 25 min

區連立明 Q: Door CT time tEPA 多少

R2 朱建勳 A: 平均 35% 新光 60% 平均 81 minutes

區連立明 Q: new good measurement of Acute Ischemic Stroke

R2 朱建勳 A: $\frac{\text{Ischemic Stroke 中接受 tPA}}{\text{所有 Ischemic Stroke}} \times 100\%$

區連立明 Q: 新指標約多少?

R2 朱建勳 A: 平均 2%, 新光 2.3%

區連立明 Q: Door to needle tEPA 多少

R2 朱建勳 A: $\frac{\text{ER < 1hr 內打 tPA}}{\text{Ischemic Stroke 可打 tPA}}$, 平均 15.6% 新光 11%

區連立明 Q: ~~Ischemic~~ Symptomatic ICH tEPA 多少?

R2 朱建勳 A: 台灣 11% SKH 12%

區連立明 Q: tPA 啟動機制會 call 誰

R2 朱建勳 A: Radiologist, ER doctor, Neurology, NS

內容摘要 (續):

VS 連立明 Q: tPA 啟動新劑量設置到

R 涂其州 A: door to CT time 20min → 14min
door to needle time 8/min → 58min

VS 連立明 Q: SKH complication rate of tPA

R 蘇法峰 A: mortality 19% bleeding rate 7%

VS 連立明 Q: Indicator of tPA

R 朱建銘 A: Onset time clear 在 < 3hour (最後五分鐘)
18-80 y/o.
CT = no TCI

<EBM and ethic>

VS 連立明 Q: 美國 & 英國 criteria 差在哪?

R 蘇法峰 A: ~~USA~~ 美國較鬆
英國較緊 → 律保用

<Take home>

1. 確認最後 normal 的時間, 非常重要.

2. tPA 啟動 10min 內
確認 25min 內 (CT 確認每 tPA)

3. Cancer hx. Exclusion criteria 可失問.

<VS comment>

VS 連立明 1. 可先找 old chart for exclusion criteria

2. 80 y/o 以上不痛報, 其他都先 ~~符命~~ 符命

3. N2HSS score 不論多少都先 ~~符命~~ 符命

4. 可新增取消拇趾

R = 朱建銘