

日期

2012年9月10日

內容摘要：

- (填寫說明：1. 如有附件請註明，如簡報檔、全文檔等
- 2. 需有問題與討論：請註明姓名並包含醫學倫理及 EBM 之應用
- 3. 需有總結，請註明做結論者【主持人】姓名
- 4. 請自行編排頁碼)

會議名稱：special lecture

地點：B2 同新樓

主持人：R4 林逸婷 / 張志華主任

記錄：R4 徐英洲

- Q1 CR 林逸婷：台灣火蟻
- A1 R1 陳穎玲：鎖鏈火蟻、眼鏡火蟻、青竹絲、百步火蟻、兩節、無殼花
- Q2 CR 林逸婷：神經毒
- A2 R1 林吉昌：兩節、眼鏡火蟻
- Q3 CR 林逸婷：鎖鏈火蟻 v.s. 無殼花?
- A3 R2 羅志威：火蟻皮上紋較圓 & 規則 → 無殼花
- Q4 CR 林逸婷：混合型火蟻?
- A4 R3 周冠華：鎖鏈火蟻
- Q5 CR 林逸婷：百步火蟻腫脹特徵
- A5 R3 許力云：局部蔓延，由肢體遠端 → 近端. Compartment syndrome
- Q6 CR 林逸婷：管心蟻?
- A6 R1 林吉昌：赤尾青竹絲
- Q7 CR 林逸婷：毒性較輕特徵?
- A7 Inv 顏士傑：無殼花 & 青竹絲
- Q8 CR 林逸婷：干擾時會有「嘶嘶」聲?
- A8 R1 陳穎玲：鎖鏈火蟻
- Q9 CR 林逸婷：眼鏡火蟻 v.s. 兩節?
- A9 R2 羅志威：眼鏡火蟻局部腫脹特徵較明顯，組織壞死可逆性
- Q10 CR 林逸婷：致死率最高?
- A10 R3 許柏彰：兩節

內容摘要 (續):

< EBM topic >

白用嘴已吸火蛇毒液。也儘可能不要把傷口切開
注射血清時應備 epinephrine 以別更過敏時引使用
橢圓形未必非毒蛇。三角形未必是毒蛇

< Evid review >

中每例情況若惡化。則需考慮是否蛇咬辨認錯誤。
< 10% 小朋友使用火蛇毒血清。則劑量需加倍。
以時間區分白步蛇。青竹絲或毒蛇。
症狀進展

< key point >

白步蛇: 腫脹·瘀血·出血·水泡·血泡 → 出血性進展快
青竹絲: 傷口會有一對牙孔。
鎖鏈蛇: 全身性出血及急性腎衰竭。

< VS comment >

若疑似毒蛇咬傷。但以出血性蛇毒血清治療反應不佳時。
則需考慮鎖鏈蛇。
兩節節中毒症狀類似腦幹中風: ptosis, drooling, respiratory failure.
咬傷處理: 患肢保持低於心臟。壓迫性包紮。

記錄 RA
徐英洲