

日期

102 年 12 月 9 日

內容摘要：

- (填寫說明：1. 如有附件請註明，如簡報檔、全文檔等
2. 需有問題與討論：請註明姓名並包含醫學倫理及 EBM 之應用
3. 需有總結，請註明做結論者【主持人】姓名
4. 請自行編排頁碼)

< Psychiatric violence problem and ER violence > 主講:D. 張志華
Beware of your surroundings

- ✓ Look for potential weapons such as IV poles or things that can be thrown
- ✓ Look for objects that the pt could use for self-harm
- ✓ Give yourself and the pt. equal access to the door.

要讓暴力者(有傾向者)先讓他有門可走，因為攔著他可能會有更大衝突。

- ✓ The comfortable zone for most people is hand shaking distance
- ✓ for paranoid or agitated pt, 2-3x the usual distance of comfortable zone
- ✓ 激動的 pt, 不要先做PE, 先叫保全來。
- ✓ 要提醒他們，這裡有“攝影機”
- ✓ 酒鬼/藥癮 \Rightarrow 30x 暴力
- ✓ Antisocial personality \Rightarrow 100x 15
- ✓ Mental illness \Rightarrow 9x
- ✓ How to de-escalate a patient \Rightarrow Use a calm voice
 - \Rightarrow Sit down with the patient
 - \Rightarrow Maintain adequate PE of at least 6 feet
 - \Rightarrow Attempt to establish rapport
 - \Rightarrow Listen to the pt's concerns


內容摘要（續）：

<Physical Restraints>

✓ 5人以上，抓住後帶O₂ mask（防吐口水），防咬人。

✓ Grade Grey > 把一隻手往上綁住

✓ 要Supine



✓ 束縛好後要搜身，防火防刀

✓ 約束前及約束後要紀錄 ICH, Head/Neck injury

✓ 給 Domitum + Haladol
2mg 5mg
1amp 1amp mixed 打IM

BZD的pt 若用的量不足，會更亂 ⇒ ex. Alcoholism 的 pt, Atran 10支才 stable
有子

✓ 酒精重毒 若加 BZD 易呼吸抑制

所以來時昏睡不清楚要驗 Alcohol 濃度

✓ 慢 Onset ⇒ Zyprexa (Olanzapine) 5~10mg IM (<20mg/hour)
會 slow thinking, 不會 sleep 10mg/tra

✓ EPS 較常 onset 在 young males, older women. (Neck tightness, 吞僵, tricks, Akina)

✓ Vena mild, Artane (Trihexyphenidyl), BT periden moderate 2.5~5mg IM, 2mg PO.
若無效則 Sedation.

紀錄非長易落

新光吳火獅紀念醫院

主持人 ⇒

科
主
任
王宗倫