

日期 103 年 03 月 15 日

內容摘要：

- (填寫說明：1. 如有附件請註明，如簡報檔、全文檔等  
2. 需有問題與討論：請註明姓名並包含醫學倫理及 EBM 之應用  
3. 需有總結，請註明做結論者【主持人】姓名  
4. 請自行編排頁碼)

< ER - Infection > combine meeting 主持人：洪世文 V.S.

28yo M, 有 poly sexual intercourse. 報告者：沈施膺

(Q&A) For post-exposure prophylaxis for HIV

Q: vs 洪世文 HIV prophylaxis drug 之注意事項？

A: ① 性行為模式 ② 降血脂藥物 Cross reaction ③ 共用針頭 ④ 藥物史，過去病史

Q vs 洪世文：有何 prophylaxis drug？

A: 1# BID Combivir (Lamivudine 150mg + Zidovudine 300mg) ⇒ Nausea, leukopenia,  
2# BID Stocrin (Efavirenz 600mg) ⇒ (HS) N/V, Dizziness, headache, poor appetite, headache, Insomnia,  
2# BID Kaletra (Lopinavir 200mg + Ritonavir 50mg) ⇒ GCTP, GPTT, T-Bil ↑  
2# QD Reyataz (Atazanavir 200mg) ⇒ transhea, abdominal pain, N/V, numbness.  
Norvir (Ritonavir 100mg) ⇒ 不可與 Antacid 並用，間隔 12hr poor appetite  
Vomiting, Diarrhea, GI upset, Jaundice, N/V, Abd pain, numbness.

Q vs 洪世文：現行預防藥都要自費，但若為性侵？

A vs. 張 (Infection) ⇒ 可自費可健保 (現無規章)；若男 → 女得 HIV 機率不大，  
若男 → 男則需 expanded the HIV drugs.

Q vs. 洪世文：關於病人同意？

A: R4 許哲彰：急診是 ~~有~~ 有驗 HIV 才給；但其實給予 HIV drug 也需 sign 同意書。  
新光吳火獅紀念醫院

內容摘要(續)： 103/63/15

Q<sub>per</sub>: 若台灣在大陸回來怕得 AIDS 要如何？

A<sub>V.S.</sub> 張(Infeciton): 超過 12hr 則不須預防性投藥

Q<sub>PGY</sub>: 貝勒克是否影響空窗期？

A<sub>V.S.張(Infeciton)</sub>: 若超過 12hr 則易有空窗期？貝勒克可能會影響。

< VS Command > 洪世文医师

給予藥物一定要注意 Side effect，須抽 GPT, T-BIL, CBC

Q: HIV prophylaxis 的 Drug 是否 100% 有效

A: 非 100% 有效

Q: PEP 之用法？

A: ① <12hr 內用 ② 包含 2~3 antiretroviral medications  
③ 吃 28 days ④ 持續使用 Condom

Q: ART - native pt dosage and regimen

A: Raltegravir 400mg BID, Elvitegravir 150mg QD  
Dolutegravir 50mg QD, + abacavir 600mg / lamivudine 300mg

Q: 細子 PEP drug 要先注意什麼？

A: T-BIL, GPT, GGT, Cr., CBC/DC

紀錄者: R. 吳冠華

