

日期

2017年10月27日

內容摘要：

(填寫說明：

1. 如有附件請註明，如簡報檔、全文檔等
2. 需有問題與討論：請註明姓名並包含醫學倫理及 EBM 之應用
3. 需有總結，請註明做結論者【主持人】姓名
4. 請自行編排頁碼)

六大核心能力

- ☐ 病人照護 ☐ 人際溝通技能
☐ 醫學知識 ☒ 從工作學習及成長
☐ 專業素養 ☐ 制度下之臨床工作

2017.10.27 0830

B2 同新園會議室

Supervisor VS 許璽文

presenter: R1 蔡宇承, A2 施廣泰

<Q&A> 9-11 回訪

Q (VS 許璽文): SBP WBC count

A (R1 蔡宇承): PMN $\geq 250 \text{ cell/mm}^3$

Q (VS 許璽文): ESRD. is platelet dysfunction with bleeding

A (R1 蔡宇承): 可用 DDAVP

Q (VS 許璽文): Child-Pugh score 之檢測項目

A (R2 鄭凱文): T-bil ($<2, 2-3, >3$), Albumin ($>3.5, 2.8-3.5, <2.8$)

P7 INR ($<1.7, 1.7-2.3, >2.3$) AST/ALT (None, mild, moderate to severe)

Hepatic encephalopathy (None, grade I-II, grade III-IV)

Child A: 5-6 Child B: 7-9 Child C: 10-15

Q (VS 許璽文): High dose PPI 用法

A (R2 劉邦月): Nexium/Pantoloc $\geq$ Amp/NS 100 ml run 10 m/h

Q (VS 許璽文): Sentinel clot sign

A (R2 施廣泰): Adjacent to injured bowel wall or mesentery

Q (VS 許璽文): 哪一類病人 Hemorrhage shock 較不會 shock

A (R1 蔡宇承): Ectopic pregnancy

內容摘要 (續):

Q (vs 許璽文): Neurogenic shock vs spinal shock

ALR (蔡司威): Neurogenic shock: sympathetic chain injury
spinal shock: spinal cord injury 受傷 level
↑ ↓ dysfunction

Q (vs 許璽文): Laryngeal fx

ALR (鄭凱文): Subcutaneous emphysema, hoarseness, palpable fx

Q (vs 許璽文): (PBM) Humeral fat pad sign

ALR (劉邦月): Anterior fat pad signs normal
Anterior sail sign or posterior fat pad sign
⇒ suspect occult fx

Q (vs 許璽文): DRG finding

ALR (施廣泰): Tarry stool: UG2 bleeding
Fresh blood: LG2 bleeding
紅色渣渣: Bowel ischemia
Currant jelly stool: intussusception

Comment (vs 許璽文): 很多病我們還是不懂, 該會診就
不要客氣, 醫病溝通還是很重要的

紀錄者: 廖劉邦月

急診醫學科
主任 王宗倫